

①

脳動脈瘤コイル塞栓術（7～10 日間）を受けられる方へ

入院日 月 日（ ） *10：30 までに 1 階入退院受付までお越しください。

手術日 月 日（ ） : ～ 開始予定（時間が前後する場合があります。）

☆入院スケジュール

入院 1 日前

ロビグアナイド系の糖尿病治療薬（ ）は、 月 日～ 月 日まで中止してください。

入院日

朝食はいつも通り食べてください。

コーヒー・紅茶・緑茶などのカフェインを含む飲料は控えてください。

薬の内服はいつも通り行い、現在飲んでいる薬は持参してください。

お化粧品・マニキュアなどは落とせるようにしてください。

10：30 に入院受付が済みましたら、病棟にご案内し、スタッフより説明があります。

21：00 以降は食事ができません。水分はとっていただけます。

手術当日

朝食は食べられません。水分は少量の水であればとっていただいても構いません。

内服薬（バイアスピリンやクロピドグレルなど）は指示通りに内服してください。

中止薬がある場合があります。入院後に確認してください。

朝から点滴を行います。

開始時間は進行状況により前後する場合があります。入院後に確認してください。

手術は全身麻酔で行い、治療時間は 3～4 時間を予定しています。

手術中に家族・関係者様が院内待機する必要はありません。（電話連絡はとれるようにしてください）

地下 1 階の検査室には歩行、もしくは車いすで向かいます。

手術は手首・足の付け根などから行い、手術後は圧迫して止血します。

手術後はベッドのまま ICU(集中治療室)に入り、全身麻酔を覚まして、翌日まで観察を行います。

家族・関係者様が付き添いされるようであれば、本人とともに手術の結果を説明します。

安静度やトイレなどは医師や看護師の指示に従ってください。

手術後 1 日目

朝、医師の診察で圧迫・固定を除去し、数日かけて安静度を上げていきます。（かかる期間は人それぞれです）

各種検査を行い、経過順調であれば一般病棟に戻ります。

退院日（7～10 日後）

家族・関係者様とともに、結果の説明を受けて頂いてから、退院となります。